

Facial-Oral Tract Therapy Swallowing Assessment of Saliva (F.O.T.T.-SAS) (DK-version af F.O.T.T.-SAS)

Kriterier for initiering af oralt indtag	Ja	Nej
1) Vågen og ved bevidsthed og/eller svarer på tiltale?		
2) I stand til at sidde opret og med nogen hovedkontrol?		
3) Nogen oral transport af sekret?		
4) Spontan eller faciliteret synkning af sekret?		
5) Hoste efter synkning af sekret?		
6) Gurglende åndedrætslyde efter synkning af sekret?		
7) Besværet åndedræt efter synkning af sekret?		
Baseret på ovenstående spørgsmål, kan oralt indtag initieres? (Oral indtag kan initieres ved kriterierne 1-4=Ja og kriterierne 5-7=Nej)		

Procedure

F.O.T.T.-SAS kan kun udfyldes efter udførelse af, som minimum vurdering af kropsfunktioner samt visuel- og taktil undersøgelse. Det optimale vil være udførelse af "Undersøgelse af mund og svælg" efter skemaet i:

Kjærsgaard A (2005) Ansigt, mund og svælg <http://munksgaard.dk/Ergo--og-fysioterapi/Ansigt-mund-og-sv%C3%A6lg/9788777493904>

F.O.T.T.-SAS anvendes som konklusionen på "undersøgelse af mund og svælg" og som konklusion på om oralt indtag kan initieres i form af f.eks. terapeutisk spisning.

*Mortensen J, Jensen D, Kjaersgaard A (2015) A validation study of the Facial-Oral Tract Therapy Swallowing Assessment of Saliva. Clinical Rehabilitation – early online
DOI: 10.1177/0269215515584381*